

Po Jums atliktos operacijos, keletą dienų galite jausti maudimą pilvo apačioje. Šiems simptomams malšinti tinka įprastiniai nuskausminamieji vaistiniai preparatai, kuriuos rekomenduos gydytojas.

Keletą dienų po operacijos gali būti kraujingų išskyrių, todėl rekomenduotina naudoti ir dažnai keisti higieninius įklotus. Nenaudokite tamponų į makštį.

Dėl infekcijos rizikos rekomenduojama 2-3 sav. neturėti lytinių santykių. Vėliau dar apie 1 mėn. lytinių santykių metu naudokite prezervatyvus.

Praėjus 2 sav. po operacijos rekomenduojama užsiregistruoti ir atvykti antrinei konsultacijai pas operaciją atlikusį gydytoją (galima registracija ir nuotoliniu būdu).

Svarbu! Esant neaiškumui dėl pakitusių išskyrių iš makšties, skausmui, karščiavimui – kreipkitės į savo šeimos gydytoją arba susisiekiite ir atvykite pas Jus operavusį gydytoją.

**Esant bet kokiems klausimams, neaiškumams skambinkite tel. nr.:**

1811	Klientų aptarnavimo centras
+370 5 244 1188	
+370 41 595396	Šiaulių Affidea klinika (tik dienos chirurgijos klausimais)
+370 37 216188	Kauno Affidea klinika (tik dienos chirurgijos klausimais)

Būkite sveika!